

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 17-11-69 980058

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION « AUVERGNE ET LIMOUSIN »

ABONNEMENT ANNUEL

(Tél. 92-97-11 - Postes 440 & 449)

(ALLIER, CANTAL, CORRÈZE, CREUSE, HAUTE-LOIRE, PUY-DE-DOME, HAUTE-VIENNE)

Régie de Recettes de la Direction Départementale de l'Agriculture

Sous-Régisseur de Recettes du Service de la Protection des Végétaux, Cité Administrative,
CLERMONT-FERRAND - 63

C. C. P. : CLERMONT-FERRAND 5.503-17

25,00 F

BULLETIN N° 110 de NOVEMBRE 1969.-

I N F O R M A T I O N S . -

TRAITEMENTS A EFFECTUER EN AUTOMNE

A) Sur Arbres Fruitiers

- Coryneum ou Maladie criblée des Arbres fruitiers à noyau

Cette maladie que l'on trouve fréquemment sur le Pêcher, se rencontre également sur l'Abricotier, le Cerisier et l'Amandier.

Sur les feuilles cette maladie se manifeste par l'apparition de petites taches rougeâtres, puis brunâtres, dont le centre se dessèche et tombe laissant le limbe perforé, d'où le nom de Maladie criblée donné parfois au Coryneum.

Les attaques sur rameaux sont de beaucoup les plus dangereuses. Les yeux sont détruits, les rameaux se dessèchent, ce qui aboutit au dépérissement des arbres négligés.

Contre cette maladie, il est recommandé d'effectuer, par temps sec, un traitement cuprique dès la chute des feuilles.

-- Chancre bactérien du Cerisier

Cette maladie se rencontre dans de nombreux vergers.

Les symptômes du chancre bactérien sont les suivants : yeux ne débourrant pas, bouquets de mai et bouquets foliaires se desséchant, branches et tronc portant des lésions profondes de l'écorce pouvant entraîner la mort de la partie située au-dessus du chancre. Ces nécroses des tissus corticaux aboutissent généralement à des néplats très caractéristiques (zones aplaties) où des exsudations gommeuses ont souvent lieu.

Les bactéries pouvant pénétrer dans la plante par les cicatrices laissées par la chute des feuilles, il est conseillé d'effectuer un traitement cuprique à l'automne.

- Chancre du Pommier

Dans les vergers où cette maladie cryptogamique, bien connue des Arboriculteurs, constitue une menace, effectuer un traitement cuprique à la chute des feuilles.

7242

Ce traitement devrait être réalisé systématiquement dans les Pépinières (dans celles-ci, il serait, d'ailleurs, de bonne pratique, d'effectuer, en automne, un traitement cuprique sur toutes les essences fruitières).

NOTA : Il a été observé cette année, dans de nombreuses régions, un développement important d'Anthraxnose sur Cerisier et de Rouille sur Prunier.

Un traitement effectué actuellement serait sans action sur ces maladies cryptogamiques : des précisions seront données en temps utile, au printemps, sur les moyens de lutte.

B) Sur Framboisiers

- Dessèchement des rameaux

Après avoir éliminé les rameaux les plus attaqués, il est conseillé d'effectuer, à la chute des feuilles, un traitement avec un produit à base de cuivre.

RENOUVELLEMENT DE L'ABONNEMENT AUX AVERTISSEMENTS AGRICOLLES

Pour le renouvellement de l'Abonnement aux Bulletins Techniques de la Station d'Avertissements Agricoles, pour 1970, attendre les précisions qui seront données dans le Bulletin n° 111 de DECEMBRE 1969.

ENQUETE AUPRES DES ABONNES

De nombreux abonnés n'ont pas encore répondu au questionnaire joint au Bulletin d'Octobre.

En faisant le nécessaire, n'omettez pas de nous indiquer la nature des problèmes d'ordre phytosanitaire qui vous préoccupent.

Clermont-Ferrand, le 14 Novembre 1969.

Le Contrôleur chargé des
Avertissements Agricoles

A. LECLERC

L'Inspecteur de la Protection
des Végétaux :

P. DENIZET.

Imprimerie de la Station de CLERMONT-FERRAND

Directeur-Gérant : L. BOUYX.